



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

33 /4-7-18

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις: Η έξοδος των ερπουσών των δύο κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:**

α) Πρώιμες περιοχές: Από 5 έως 9 Ιουλίου

β) Όψιμες περιοχές: Από 9 ως 13 Ιουλίου.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Θερινός πολτός (σε θερμοκρασίες πάνω από 32°C μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες), *Αζαντιραχτίν Α*, *Ασεταμιπρίντ*, *Δελταμεθρίν*, *Πυριπροξιφέν*, *Σπιροτετραμάτ*, *Σουλφοξαφλόρ*, *Χλωρπυριφός*, *Χλωρπυριφός-μεθύλ*. Επειδή αυτήν την εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα φ.π. που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2. Chrysomphalus sp

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές στα εσπεριδοειδή της ΠΕ Κορινθίας. Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 5 έως 9 Ιουλίου**

Φυτ/κά

προϊόντα:

Θερινός πολτός.

3. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ-ΛΕΚΑΝΙΟ –ΚΟΚΚΟΣ (Coccus hesperidum)- ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από τα ανωτέρω κοκκοειδή, να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα. Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.**

Φυτ/κά

προϊόντα:

Ψευδόκοκκος: *Θερινός πολτός*, *Ασεταμιπρίντ*, *Σπιροτετραμάτ*, *Σουλφοξαφλόρ*, *Χλωρπυριφός*, *Χλωρπυριφός-μεθύλ*.

Λεκάνιο: *Θερινός πολτός*, *Δελταμεθρίν*, *Πυριπροξιφέν*, *Σπιροτετραμάτ*, *Χλωρπυριφός*, *Χλωρπυριφός-μεθύλ*.

Κόκκος: *Θερινός πολτός*, *Σπιροτετραμάτ*.

Ισέρυα: *Θερινός πολτός*, *Χλωρπυριφός*, *Χλωρπυριφός-μεθύλ*. ▶

4.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες:

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος λόγω των υψηλών πληθυσμών του εντόμου. Να συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια του φ.π που χρησιμοποιείτε.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

1) Ψεκασμοί κάλυψης :

Βιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana strain atcc 74040*, { Λάμντα σουαλοθρίν , Μαλαθιον-7 ημέρες πριν την συγκομιδή}, { Δελταμεθρίν 30 ημέρες πριν την συγκομιδή, { Ασεταμιπρίντ, Φοσμέτ 14 ημέρες πριν την συγκομιδή}.

2) Χρήση παγίδων στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.

5.ΘΡΙΠΕΣ



Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπήρχαν τέτοια συμπτώματα πέρυσι ελέγξτε άμεσα καρπίδια και στην περίπτωση που το 5-10% των καρπιδίων έχουν προσβολή να γίνει επέμβαση.

**Φυτ/κά
Προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αζαντιραχτίν Α, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός.

6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Ο Φυλλοκνίστης βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με επανάληψη των επεμβάσεων ανάλογα με το ΦΠ που χρησιμοποιείτε. Για τον Εριώδη Αλευρώδη ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στο 23/21-5-18 δελτίο.

7. ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες:

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Επέμβαση απαιτείται όταν διαπιστώνετε προσβολές.

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αζαντιραχτίν, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, Λάμντα σουαλοθρίν, Ντιμεθοείτ, Γιριμικάρμπ, Πυμετροζίν, Σπιροτετραμάτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

8. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες:

**Φυτ/κά
Προϊόντα:**

Επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφenaζείτ, Σπιροντκιοφέν, Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια, Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α
Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**