



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

35/5-7-18

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.

Οδηγίες-Φυτ/κά προϊόντα: Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Άμεσα με: Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ (14 ημ.), Φενοξυκάρμπ (30 ημ.), Χλωραντρανιλιπρόλ (14 ημ.).

2. Μέχρι 9 Ιουλίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες (**3 & 1 ημ. ανάλογα με το σκευάσμα**), Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), Μεθοξυφenoζάντ (14 ημ.), Τεμπουφenoζάντ (14 ημ.),

3. Από 10 ως 13 Ιουλίου με:

Δελταμεθρίν (7 ημ.), Εμαμεκτίν μπενζοείτ (-3 ημ.), {Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά (7 ημ.)}, Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ.), Σπινোসάντ (14 ημ.), Τ-Φλουβαλινείτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.), Χλωρπυριφός μεθύλ (21 ημ.).

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Άμεσα με: Χλωραντρανιλιπρόλ.

2. Μέχρι 9 Ιουλίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία

3. Από 10 ως 13 Ιουλίου με:

Δελταμεθρίν Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Σπινετοράμ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στα μηλοειδή των πεδινών περιοχών να γίνει επαναληπτική επέμβαση άμεσα με:

Δελταμεθρίν (7 ημ.), Εμαμεκτίν μπενζοείτ (-3 ημ.), {Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά (7 ημ.)}, Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ.), Σπινোসάντ (14 ημ.), Τ-Φλουβαλινείτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.), Χλωρπυριφός μεθύλ (21 ημ.).

2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. ►

**Φυτ/κά
προϊόντα:** Βλέπε δελτίο 20/2-5-18.

3.ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων να γίνεται επέμβαση.

**Φυτ/κά
Προϊόντα:** Βλέπε δελτίο 20/2-5-18.

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε απαιτείται επέμβαση.

Φυτ/κά Βλέπε δελτίο 20/2-5-18.

Προϊόντα:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

5. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Στις ποικιλίες αχλαδιών που ο καρπός είναι επιδεκτικός προσβολής από το έντομο, να ξεκινήσει άμεσα η προστασία και να συνεχιστεί ως την συγκομιδή.

Φυτ/κά *Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν* (παγίδες ή ψεκασμός κάλυψης).

προϊόντα:

6. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ

Οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς.

Οδηγίες: Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνιση της «ασθένειας» από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού.

Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να είναι επαναλαμβανόμενος ανά 15-20 ημέρες.

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς.

Να αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως, ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.

7. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες: Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Μέχρι 9 Ιουλίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Βάκιλλος Θουριγγίας*.

2 Από 10 ως 13 Ιουλίου με: *Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.*

Στις καρυδιές των πεδινών περιοχών να γίνει επαναληπτική επέμβαση άμεσα με: *Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &α.α

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ